



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TARIM GIDA VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	823
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	NK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	22541
Marka veya Ticari Adı(varsa)	MR. MAXIMUM 15-0-6 (6MgO) + TE
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TARIM GIDA VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	NK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N: 15, Amonyum N: 1,8, Nitrat N: 2,5, Üre N: 10,7, Suda Çözünür PotasyumOksit(K ₂ O): 6
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO): 6
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B): 0,1, Suda Çözünür Mangan(Mn): 5, Suda Çözünür Çinko(Zn): 4
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	-
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25-0,3-0,5-1-2-2,5-4-5-10-15-18-20-25- 30-50 Kg
Depolama Sıcaklığı	0/45 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz, Uyarılar, Parti No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Firma Telefonu, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı, Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız, Net Ağırlık, Diğer Güvenlik Tedbirleri, Klor İçeriği:
Veriliş Nedeni	Süre Dolumu Nedeni İle Yenileme
Bu belge 08/04/2019 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih: 08/04/2019

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

EC FERTILIZER
NK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
MR. MAXIMUM 15-0-6+(6MgO) + TE

TAMAMI SUDA ÇÖZÜNÜR
GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ

	(W/W)
Toplam Azot (N)	%15
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	%2,5
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	%1,8
Üre Azotu (NH ₂ -N)	% 10,7
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%6
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	%6
Suda Çözünür Bakır Bor (B)	% 0,1
Suda Çözünür Mangan (Mn)	%5
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%4

KLOR İÇERİĞİ: % 0,28

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ



ÜRETİCİ

AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER
TARIM GIDA VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİC. A.Ş.
KAYAPA MAHALLESİ KAYAPA SANAYİ BLV. FABRİKA GİRİŞİ APT. NO:35/1
NİLÜFER/BURSA

TLF 0224 236 08 08, FAKS : 0224 236 08 06

UYARILAR

- *DİKKAT TAHRİŞ EDİCİDİR *Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz
- *Çocuklardan, hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz * Göz, Yüz ve Deri ile temas ettirmeyiniz. Teması halinde bol su ile yıkayınız, Teneffüs etmeyiniz, Yutmayınız. *Önerilen dozajı aşmayınız * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız. *
- Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

DEPOLAMA

Doğrudan güneş almayan, iyi havalandırılmış, serin bir depoda ağzı kapalı olarak muhafaza edilmelidir. Depolama sıcaklığı: 0 +45 °C (derece) olmalıdır.

FİRMA BEYANI

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır

TESCİL NO: 22541

LİSANS NO: 823

ÜRETİM TARİHİ:


SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

PARTİ NO:

NET AĞIRLIK: 0,250- 0,30- 0,50- 1 -2 - 2,5- 4- 5- 10- 15- 18- 20- 25 -30- 50 Kg.

X

Tahriş Edicidir



AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR END. ÜRÜN. TAR.
GIDA VE İLAÇ AMB. SAN. VE TİC. A.Ş.
Kayapa Mah. Kayapa Sanayi Bulvarı No:35
Nilüfer / BURSA
Cekirge V.D. - Vergi No: 0091 0707 21

Celal AKKAYA
Firma Temsilcisi

KULLANIMI VE TEKNİK TALİMATLARI

Kullanımdan önce, etiket bilgilerini tamamen okuyunuz. Kuvvetli Alkali (yüksek pH) ve Kuvvetli asitlerle (düşük pH), klor, organik fosfor, alüminyum içeren kimyasallarla ve aktif kükürt içeren bileşiklerle karıştırmayınız. Kullanım sırasında ve sonrasında tüm koruyucu önlemlere dikkat ediniz. Uygulama sırasında çocuklar ve koruma önlemi almamış şahıs ve canlıları uzak tutunuz. Tavsiye edilen dışında başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşa, mutlaka üretici firmayla veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek bilgi alınız. Üretici firma veya bayi ile temas kuramadığınız durumlarda, şeffaf bir kap içerisinde 100 ml su koyunuz, içerisine 1 veya 2 gr ürün ekleyiniz. Eğer ki: çökme, suda çözünmeyen malzeme oluşumu, kesilme veya gaz çıkışı gözlemlenirse, karışımı yapmayınız. Bu uygulamayı mutlaka açık alanda ve belirtilen koruyucu önlemler aldıktan sonra yapınız.

KULLANIM DOZLARI VE ZAMANI

Bitki adı	Uygulama Dozu		Uygulama Adedi	Uygulama zamanı		
	gr/dekar	gr/100 lt su		1. Uygulama	2. Uygulama	3. Uygulama
Turungiller, Zeytin	-	50-100	2-3	Çiçeklenme öncesi	Tam çiçeklenmeden 30 gün sonra	Yaz sürgününde
Sert çekirdekli meyve (Şeftali, Kiraz, Kayısı, Erik vb.)	-	50-100	2	Çiçeklenme sonrası	15 gün sonra	
Yumuşak çekirdekli meyve ağaçları (Elma, Armut, Ayva, Nar vb.)	-	50-100	2	Çiçeklenme sonrası	Yaz sürgününde	
Bağ	-	50-100	2-3	Salkımların dolmasında kısa bir süre önce	Taneler olgunlaşınca kadar 10-14 gün ara ile 1-2 uygulama	
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Patates vb.)	50-100	50-100	1-3	Çiçek başlangıcı	10-15 ara ile	
Çeltik	50-100	-	1-2	Kardeşlenme başlangıcı	Sapa kalkma döneminde	
Mısır	50-100	50-100	1	40-50 cm boyda tek uygulama		
Pamuk	70-100	-	2	Tarak öncesi	1. Uygulamadan 15 gün sonra	
Kavun, Karpuz, Hıyar, Kabak	50-100	50-100	2-3	Çıkiştan 30-50 gün sonra	10 gün aralıklarla	
Şekerpancarı	50-100	50-100	1-2	6 yaprak dönemi	30 gün sonra	
Kesme Çiçekçilik	-	25-100	2-3	Solüsyon toprağa verilir	10 gün aralıklarla	
Yer fıstığı, Soya, Yonca	50-100	50-100	1-2	Çiçeklerin tomurcuklanma döneminde	15 gün sonra	
Fındık	-	50-100	2	Yaprak teşekkülünde	30 gün sonra	
Buğday, Arpa, Yulaf	100	-	1	Kardeşlenme döneminde	-	
Bezelye, Fasulye, Bakla, Havuç	50-100	-	1-2	Çiçeklenmeden kısa süre önce	15 gün sonra	
Lahana, Marul, Karnabahar	50-100	50-100	2-3	Göbek bağlamadan önce	10 gün aralıklarla	
Çilek	50-100	-	2-3	Çiçeklenme öncesinde	10 gün aralıklarla	
Fidanlar	100 lt suya 100 gr dozunda birer hafta aralıklarla verilir.					

FİRMA TAAHÜTÜ: Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin, ürün içeriği ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde, 4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi peşinen

09.04.19.

AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR END. ÜRÜN. TAR.
GIDA VET. İLAÇ. AMP. SAN. VE TİC. A.Ş.
Kavaypa Mah. / Kavaypa Sanayi Bulvarı No:35
Nilüfer / BURSA
Çekirge V.D. - Vergi No: 0091 0707 21

Celal AKKAYA
Firma Temsilcisi